

Информация для пациентов

Регламент основных осмотров и обследований ВИЧ-инфицированных беременных при диспансерном наблюдении в территориальном центре профилактики и борьбы со СПИДом

Раздел	Кратность (за время беременности)	Пояснения
Консультации врачей-специалистов обязательные		
врач-инфекционист	ежемесячно	при назначении обследования, по его результатам (назначение АРТ), для оценки переносимости АРТ
врач-терапевт	1 (дополнительно по показаниям)	—
врач-офтальмолог	2 (1 и 3 триместры)	
врач-оториноларинголог	2 (1 и 3 триместры)	
врач-невролог	2 (1 и 3 триместры)	
врач стоматолог-терапевт	2 (1 и 3 триместры)	
врач акушер-гинеколог	ежемесячно	осмотр врачом акушером-гинекологом <i>предшествует</i> осмотру врачом-инфекционистом с целью более точного установления срока
врач-фтизиатр	по показаниям	—
<i>дополнительные консультации специалистами</i>	по показаниям	врач-психиатр (психотерапевт, нарколог), психолог, социальный работник
Лабораторная диагностика обязательная		
анализ крови клинический	ежемесячно	—
анализ мочи клинический	ежемесячно	
анализ крови биохимический	1 раз в триместр	
микроскопия гинекологического мазка	1 раз в триместр	
лабораторное обследование		

на наличие заболеваний, передающихся половым путём	1 (при постановке на учёт)	
лабораторное обследование на сифилис	2 (при постановке на учёт (1 триместр, 3 триместр))	
скрининг: HBsAg, Anti-HCV	2 (при постановке на учёт (1 триместр, 3 триместр))	
серологические маркеры вирусных гепатитов методом ИФА (панель)	1	при положительном результате скрининга

ИФА на ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, токсоплазмоз	2 (в 1-м и третьем триместрах беременности)	
ПЦР на ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, токсоплазмоз	по показаниям	
исследование уровня CD4 ⁺ -лимфоцитов	при постановке на учёт в центре профилактики и борьбы со СПИДом по беременности, затем 1 раз в 3 месяца, перед родами (на 30 неделе)	
вирусная нагрузка ВИЧ	при постановке на учёт в центре профилактики и борьбы со СПИДом по беременности, далее ежемесячно до достижения неопределяемого уровня, перед родами (на 30 – 32 неделе)	–
выявление аллели 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека (HLA-B*5701)	выполняется, если не поставлен ранее	

Лабораторная диагностика дополнительная

вирусная нагрузка ВГВ и ВГС	1	при обнаружении в ИФА указанных инфекций
ПЦР на ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, токсоплазмоз	1	при обнаружении в ИФА указанных инфекций
тест на резистентность ВИЧ к АРВП	по показаниям	–
др. лабораторные исследования	по показаниям	–

Инструментальные исследования обязательные

ЭКГ	1	
УЗИ органов брюшной полости	1	–

УЗИ плода	3	в 12 недель, 22 – 24 недели и в 32 – 34 недели
Инструментальные исследования дополнительные		
др. инструментальные исследования	по показаниям	–