

Информация для пациентов

Основные этапы и мероприятия по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку по неделям беременности (НБ)

НБ	Этапы профилактики	Мероприятия по профилактике				
1		1-й триместр:				
2		—	анализ крови на антитела к ВИЧ;	в т.ч. ежемесячно: — консультации врачом-инфекционистом;		
3						
4						
5						
6					— явка в центр профилактики и борьбы со СПИДом;	— консультация врачом акушером-
7					— решение вопроса о прерывании беременности или продолжении	гинекологом;
8					— анализ на иммунный статус;	
190					АРТ, (если женщина получала	— анализ на вирусную нагрузку
11					беременности)	
12					— завершающий срок первого обследования беременной на ВИЧ-инфекцию	—
13	— начало АРТ				2-й триместр:	
14		необходимы еженедельное приглашение и патронаж на акушером-Профилактика	в т.ч. ежемесячно: — консультации врачом-инфекционистом;			
15						
16						
17						
18				— если беременная не пришла на приём к врачу-инфекционисту	— консультация врачом-	
19				инфекционистом;		
20				дому. — консультация врачом передачи ВИЧ- гинекологом;		
21				инфекции от матери к ребёнку — назначается сразу при вирусную нагрузку на учёт	анализ на иммунный статус; постановке — анализ на	
22				— АРТ, на 21 неделе и позднее повышается риск сохранения вирусной нагрузки к моменту		

23	родов, что повлечет за
24	собой необходимость
25	кесарева сечения и проведения усиленной схемы профилактики у новорожденного

26	– увеличение дозы препарата Лопинавир / Ритонавир	3-й триместр: – если беременная не пришла на приём к врачу-инфекционисту, необходимы еженедельное приглашение и патронаж на дому. АРТ назначается сразу при постановке на учёт	в т.ч. ежемесячно: – консультации врачом-инфекционистом; – консультация врачом акушером-гинекологом; – анализ на иммунный статус (до 30-й недели); – анализ на вирусную нагрузку (до 30-й недели)
30-32	– анализ крови на вирусную нагрузку и иммунный статус; – проба вирусной нагрузки является завершающей с точки зрения тактики ведения родов		
32-34	– последнее посещение врача-инфекциониста, беременная обеспечивается препаратами до родов, выдается заключение для родильного стационара		

40	– заменить комбинированный препарат Ламивудин / Зидовудин на Зидовудин в инфузии и Ламивудин	– РОДЫ	– женщине с неизвестным ВИЧ-статусом при поступлении в роддом проводится экспресс-тестирование
→	– профилактика ребёнку не позднее 6 часов жизни (монотерапия или тритерапия) – запрет грудного вскармливания ; – в первые 24 часа жизни – забор крови на антитела к ВИЧ и ПЦР	– новорожденный	–
→	– доза препарата Лопинавир / Ритонавир снижается с 3-й недели после родов	– женщина после родов	–